



Helicobacter pylori Rezidiv Eradikationsschemata: Alternativen

1. Bismuth-basiert, während 10 Tagen:

| | Morgen | Mittag | Abend | Nacht | |
|---|--------|--------|-------|-------|----------------------|
| Behandlung während 5 Tagen: | | | | | |
| Protonenpumpenblocker # | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 Min vor dem Essen |
| Pylera® caps (Bismuth + Tetracyclin + Metronidazol) | 3 | 3 | 3 | 3 | Zum Essen |

2. Behandlung während 10 Tagen:

| | Morgen | Mittag | Abend | |
|-------------------------|--------|--------|-------|-------------------|
| Protonenpumpenblocker # | 1 | 0 | 1 | ¼ h vor dem Essen |
| Klacid® Tbl. 500 mg | 1 | 0 | 1 | Zum Essen |
| Flagyl® Tbl. 500 mg | 1 | 0 | 1 | Zum Essen |
| Amoxicillin® Tbl. 1g | 1 | 0 | 1 | Zum Essen |

3. Hybrid:

| | Morgen | Mittag | Abend | |
|--|--------|--------|-------|-------------------|
| Behandlung während 7 Tagen: | | | | |
| Protonenpumpenblocker # | 1 | 0 | 1 | ¼ h vor dem Essen |
| Amoxicillin® Tbl. 1 g | 1 | 0 | 1 | Zum Essen |
| Anschliessend Behandlung während 7 Tagen: | | | | |
| Protonenpumpenblocker # | 1 | 0 | 1 | ¼ h vor dem Essen |
| Amoxicillin® Tbl. 1 g | 1 | 0 | 1 | Zum Essen |
| Klacid® Tbl. 500 mg | 1 | 0 | 1 | Zum Essen |
| Flagyl® Tbl. 500 mg | 1 | 0 | 1 | Zum Essen |

z.B.:

Esomeprazol 40 mg, Lansoprazol 30 mg, Pantoprazol 40 mg oder Omeprazol 40 mg

Wir empfehlen die Überprüfung der HP-Eradikation mittels Stuhlantigen oder Atemtest 1 Monat nach Absetzen der Antibiotika- und PPI-Therapie. Die HP-Resistenzprüfung erfolgt mittels Magen- biopsien und Kultur bei wiederholter Persistenz des HP trotz guter Compliance.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.