



Scan mich

## Helicobacter pylori Rezidiv Eradikationsschemata: Alternativen

### 1. Bismuth-basiert, während 10 Tagen:

	Morgen	Mittag	Abend	Nacht	
<b>Behandlung während 5 Tagen:</b>					
Protonenpumpenblocker #	1	0	1	0	30 Min vor dem Essen
Pylera® caps (Bismuth + Tetracyclin + Metronidazol)	3	3	3	3	Zum Essen

### 2. Behandlung während 10 Tagen:

	Morgen	Mittag	Abend	
Protonenpumpenblocker #	1	0	1	¼ h vor dem Essen
Klacid® Tbl. 500 mg	1	0	1	Zum Essen
Flagyl® Tbl. 500 mg	1	0	1	Zum Essen
Amoxicillin® Tbl. 1g	1	0	1	Zum Essen

### 3. Hybrid:

	Morgen	Mittag	Abend	
<b>Behandlung während 7 Tagen:</b>				
Protonenpumpenblocker #	1	0	1	¼ h vor dem Essen
Amoxicillin® Tbl. 1 g	1	0	1	Zum Essen
<b>Anschliessend Behandlung während 7 Tagen:</b>				
Protonenpumpenblocker #	1	0	1	¼ h vor dem Essen
Amoxicillin® Tbl. 1 g	1	0	1	Zum Essen
Klacid® Tbl. 500 mg	1	0	1	Zum Essen
Flagyl® Tbl. 500 mg	1	0	1	Zum Essen

# z.B.:

Esomeprazol 40 mg, Lansoprazol 30 mg, Pantoprazol 40 mg oder Omeprazol 40 mg

Wir empfehlen die Überprüfung der HP-Eradikation mittels Stuhlantigen oder Atemtest 1 Monat nach Absetzen der Antibiotika- und PPI-Therapie. Die HP-Resistenzprüfung erfolgt mittels Magenbiopsien und Kultur bei wiederholter Persistenz des HP trotz guter Compliance.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.